



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70%

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70%

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Sachet 2 ml (230600)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,100 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35 * 21 * 23
Nb total de produit par palette	60 cartons de 1000 lingettes
Poids total palette (hors palette)	250 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
230600	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
230554	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	186 mm	290 mm

Présentation

L'alcool isopropyl 70% est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le format lingette est adapté pour les kits de premiers secours, trousse à pharmacie mais il est également très utilisé par les infirmières et le personnel itinérant. Il s'agit d'un mouchoir semi crêpé de 42 gr particulièrement résistant, absorbant et non abrasif. Déplié son format est de 130 x 160mm.

- L'alcool isopropyl 70% est un assainissant corporel
- Action immédiate
- Usage unique



COMPOSITION : Alcool isopropyl 70% (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 69,5%, Alcool éthylique (CAS 64-17-5, CE 200-578-6) 0,5%

MODE D'EMPLOI : Lingettes imprégnées permettant la désinfection des surfaces corporelles saines et des surfaces non alimentaires. Application pour 0,2m², à renouveler toutes les 6 heures si nécessaire. Usage externe, usage unique.

PRÉCAUTIONS : Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Ne pas utiliser pour un usage autre que pour lequel le produit est prévu.