



Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le pulvérisateur 50 ml sans gaz est un petit format adapté pour les kits de premiers secours, les trousseaux à pharmacie mais il est également très utilisé par les infirmières et le personnel itinérant. L'utilisation d'une compresse est recommandée pour ce produit.

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel
- Action immédiate
- Mini dose adaptée pour un usage économique



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%

(GB)
ISOPROPYL ALCOHOL 70%

(NL)
ALCOHOL ISOPROPYL 70%

(E)
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Pulvérisateur 50 ml (4154)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	1,700 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	23,5* 11* 16
Nb total de produit par palette	3168 unités
Poids total palette (hors palette)	225 kg
Dimension totale hors palette	80* 120* 70

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
230600	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
230554	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	186 mm	290 mm

COMPOSITION : Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 69,5%, Alcool éthylique (CAS 64-17-5, CE 200-578-6) 0,5%

MODE D'EMPLOI : Appliquer directement sur une surface corporelle ou non alimentaire. Permet de désinfecter la zone ciblée même difficilement accessible. En cas de nécessité, répéter l'opération toutes les 6 heures. Eviter le contact avec les zones épidermiques sensibles et les muqueuses.

PRÉCAUTIONS : Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Ne pas utiliser pour un usage autre que pour lequel le produit est prévu.